



ПОЛТАВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ортодонції
Зав. кафедри:
д. мед. н., професор
Смаглюк Л. В.



5 КУРС

Тема 11 заняття:

Морфологічні та функціональні вікові особливості розвитку та формування зубо-щелепного апарату дитини та їх клінічна оцінка.

Полтава 2024

У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зубами, прямий контакт між різцями, стертість різальних країв різців, дистальні поверхні 2-х тимчасових молярів утворюють медіальну сагітальну сходинку – симптом Цилінського. Який це період формування прикусу?

У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зубами, прямий контакт між різцями, стертість різальних країв різців, дистальні поверхні 2-х тимчасових молярів утворюють медіальну сагітальну сходинку – симптом Цилінського. Який це період формування прикусу?

У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зубами, прямий контакт між різцями, стертість різальних країв різців, дистальні поверхні 2-х тимчасових молярів утворюють медіальну сагітальну сходинку — симптом Цилінського. Який це період формування прикусу?

період старіння тимчасового прикусу
пізній змінний прикус.

ранній змінний прикус

період формування тимчасового прикусу

період стабілізації тимчасового прикусу

У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зубами, прямий контакт між різцями, стертість різальних країв різців, дистальні поверхні 2-х тимчасових молярів утворюють медіальну сагітальну сходинку — симптом Цилінського. Який це період формування прикусу?

період старіння тимчасового прикусу

пізній змінний прикус.

ранній змінний прикус

період формування тимчасового прикусу

період стабілізації тимчасового прикусу
