



ПОЛТАВСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ортодонції
Зав. кафедри:
д. мед. н., професор
Смаглюк Л. В.



5 КУРС

Тема 14 заняття:

Планування ортодонтичного лікування.

Полтава 2024

При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі -11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу?

При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі -11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45.

45. Який **додатковий** метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і **клінічну форму аномалії** прикусу?

При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі - 11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу?

Профільна телерентгенографія

Визначення лицевого індексу за Ізром

Проведення клінічних функціональних проб

Ортопантомографія

Антропометричне вимірювання моделей щелеп

При клінічному обстеженні дівчинки 10-ти років у порожнині рота: щілина по сагіталі - 11 мм, контакт верхніх бічних зубів з попереду розташованими нижніми, розташування медіально-щічних горбів 16 та 26 на горбах 35 і 45. Який додатковий метод дослідження допоможе встановити остаточний діагноз і клінічну форму аномалії прикусу?

Профільна телерентгенографія

Визначення лицевого індексу за Ізром

Проведення клінічних функціональних проб

Ортопантомографія

Антропометричне вимірювання моделей щелеп
